

Przygotowanie pacjenta do badania USG jamy brzusznej,

RTG jamy brzusznej,

RTG kręgosłupa L-S i stawów krzyżowo-biodrowych

Najistotniejszą przeszkodą w prawidłowej ocenie narządów jamy brzusznej oraz kręgosłupa lędźwiowego i stawów krzyżowo-biodrowych jest zaleganie treści pokarmowej i gazu w żołądku, dwunastnicy i jelitach.

O ile lekarz nie zaleci inaczej:

Badanie należy wykonywać na czczo.

- co najmniej 6 godzin przed badaniem nie można nic jeść, dopuszcza się picie niegazowanej wody, małymi porcjami starając się przy tym unikać nadmiernego połykania powietrza,
- nie należy żuć gumy ani palić papierosów,
- pacjenci przyjmujący leki – powinni leki przyjąć zgodnie z zaleceniem lekarza, popijając je niegazowaną wodą, nie później jednak, niż 1 godzinę przed badaniem,
- w godzinach popołudniowych/wieczornych w dzień poprzedzający badanie, należy unikać pokarmów i płynów wzdymających, napojów gazowanych, jogurtów, itp.
- pacjenci z tendencją do wzdęć – poza w/w zaleceniami, powinni zachować lekkostrawną dietę już dwa dni przed badaniem,
- w dniu poprzedzającym badanie, oraz rano w dniu badania należy przyjąć SimetiGast Forte, Espumisan, lub inny środek odgazowujący – dostępny w aptece bez recepty.

Przygotowanie do badania USG j. brzusznej u dzieci:

- noworodki i niemowlęta - nie karmić i nie poić ok. 1-1.5 godz. przed badaniem, w celu oceny odźwiernika proszę przynieść ze sobą w butelce mleko ewentualnie inny napój;
- dzieci od 1 do 5 roku życia – badanie powinno być wykonane co najmniej 2 godziny od ostatniego posiłku, nie poić dziecka bezpośrednio przed badaniem;
- dzieci starsze (powyżej 5 roku życia) – badanie powinno być wykonane około 4 godziny po ostatnim posiłku;
- młodzież (od 15 roku życia) badanie powinno być wykonane około 6 godzin po ostatnim posiłku;
- dzieci z tendencją do wzdęć – o ile to konieczne, podać Espumisan – zgodnie z zaleceniami lekarza.